

Instrucciones de preparación y aplicación del **IMMUNE POTENT CRP**




1

Rompa la ampolleta de la solución inyectable. Coloque el dedo pulgar sobre la parte superior de la ampolla y presione hacia atrás para abrirla.




2

Cargue una jeringa de 3 cc hasta la marca de 2 cc de Solución inyectable



3

Deposite el contenido de la jeringa en el interior del frasco de **IMMUNE POTENT CRP**. Disuelva el contenido suavemente



4

Cargue la jeringa Con todo el contenido del frasco



5

Coloque el frasco de Xilocaína simple inyectable sobre una superficie plana. Introduzca la jeringa en el frasco y tome solo 2 dm (2 rayitas pequeñas lo suficiente para cubrir el área de la aguja).

No incline el frasco



6

Así como saca la jeringa del frasco, sin Invertir, mover ni inclinar, inyecte en forma intramuscular.

NOTA IMPORTANTE:

DESPUÉS DE CARGAR LA JERINGA CON LA XILOCAÍNA, TENGA CUIDADO DE NO VOLTEARLA NI INCLINARLA PARA EVITAR QUE SE MEZCLE LA XILOCAINA CON LA PREPARACIÓN. MANTENGA LA AGUJA HACIA ABAJO PARA QUE ENTRE PRIMERO LA XILOCAINA. APLICACION INTRAMUSCULAR.